

## Outras espécies

Espécie	Presença (X) ou n.º ind	Espécie	Presença (X) ou n.º ind
Grifo		Alvéola-branca	
Águia Real		Rouxinol	
Águia Cobreia		Melro	
Águia Calçada		Melro-azul	
Milhafre-preto		Toutinegra-dos-valados	
Peneireiro		Toutinegra-de-bigodes	
Falcão-peregrino		Charneco	
Pombo-das-rochas		Gralha-de-bico-vermelho	
Pombo-torcaz		Corvo	
Andorinhão-preto		Tentilhão	
Andorinhão-real		Pintarroxo	
Andorinhas-das-rochas		Pintassilgo	
Andorinha-dáurica		Verdilhão	
Andorinha-dos-beirais			

## NOTAS



## FICHA DE CAMPO Aves das Arribas do Douro



Olá! Trago um desafio! A observação de **espécies ameaçadas** das **arribas do Douro**! Elas são muito queridas e estão à espera para te conhecer!

Observador: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Local: \_\_\_\_\_  
 Hora início: \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ Hora fim: \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_  
 Tempo:  Céu limpo  Céu nublado  Chuva  Vento

## Espécies

### 1 Britango

(*Neophron percnopturus*)

-**Descrição:** Também conhecido por abutre-do-Egito é o mais pequeno dos abutres ibéricos. É uma ave de rapina de plumagem essencialmente branca e preta, face amarela e cauda longa e cuneiforme. Os imaturos são totalmente castanhos, apresentando também a cauda em forma de cunha.

-**Deslocações:** É um migrador estival, que pode geralmente ser visto em Portugal e Espanha a partir de finais de fevereiro, permanecendo nas zonas de nidificação de março a setembro. Durante o outono migra para sul, passando o inverno na África sub-saariana.

-**Habitat:** Prefere zonas acidentadas, normalmente em vales fluviais e montanhas, nidificando em buracos e plataformas rochosas.

-**Estatuto da Conservação:** Em perigo (EN)

### 2 Águia-perdigueira

(*Aquila fasciata*)

-**Descrição:** Também conhecida por águia-de-bonelli, deve o nome ao hábito de preda outras aves, desde pombos a perdizes, capturando-os em pleno voo. É uma águia de grande dimensão, que se identifica pelo ventre branco, asas escuras e uma mancha branca no dorso. As aves juvenis apresentam o ventre e as penas inferiores das asas de tom alaranjado.

-**Deslocações:** Esta águia é residente na Península Ibérica.

-**Habitat:** É uma espécie rara e localizada, que ocorre essencialmente em vales escarpados e zonas acidentadas e florestadas. Pode construir o ninho em escarpas ou em árvores de grande porte.

-**Estatuto da Conservação:** Em perigo (EN).

### 3 Milhafre-real

(*Milvus milvus*)

-**Descrição:** É uma ave de rapina de médio-porte, de tonalidades castanho-claro, com duas áreas brancas (“janelas”) na parte inferior das asas e cauda bastante forçada. É um planador exímio, sendo frequentemente observado a circular em correntes térmicas, num voo calmo e pausado.

-**Deslocações:** Na Península Ibérica ocorrem duas populações de milhafre-real. Uma população nidificante e residente, no norte e centro, que se encontra em declínio acentuado. Durante o inverno ocorre uma população migradora, muito maior, constituída por aves provenientes da Europa do Norte.

-**Habitat:** Ocorre em campos abertos e montados, normalmente associado à presença de gado, mas nidifica em árvores.

-**Estatuto da Conservação:** População Residente: Criticamente em perigo (CR)  
 População Invernante: Vulnerável (VU)

### 4 Abutre-preto

(*Aegypius monachus*)

-**Descrição:** É a maior ave planadora da Europa. Distingue-se pelo tamanho, pelas asas largas, com uma envergadura que pode atingir os 3 metros, cauda curta e plumagem totalmente escura, quase negra.

-**Deslocações:** É sedentário, mas percorre grandes distâncias em busca de alimento, particularmente fora da época reprodutora. Nidifica no topo de árvores isoladas.

-**Habitat:** É uma ave pouco abundante na Península Ibérica, ocorrendo apenas em zonas remotas, acidentadas ou planas, com pecuária extensiva.

-**Estatuto da Conservação:** Criticamente em perigo (CR)



\*Cola aqui a imagem das espécies