IDENTIFICAÇÃO DE AVES

Picanços – os mascarados

Reconhecidos pela mascarilha preta e por se mostrarem facilmente, muitas vezes empoleirados em ramadas altas, cercas ou fios elétricos, os picanços são aves de dimensão média com um bico forte e curvo, adaptados a apanhar uma variedade de presas.

Das três espécies de picanço que regularmente ocorrem no nosso país, duas (picanço-barreteiro (*Lanius senator*) e picanço-real (*Lanius meridionalis*)) têm sofrido decréscimos nos últimos anos, devido às mudanças dos sistemas agroflorestais, como a intensificação da produção através de extensas monoculturas e uso de agroquímicos. O declínio do picanço-barreteiro tem sido particularmente acentuado. Como identificar cada um destes "mascarados"? Nós ajudamos.

Picanço-de-dorso-ruivo

Lanius collurio

- Norte do país, Gerês, Barroso e Montesinho
- Bosques dispersos e zonas abertas de altitude
- Migrador, visita-nos na primavera/verão

Picanço-barreteiro

Lanius senator

- Mais comum no Sul do país e ao longo da fronteira
- Habitats agroflorestais abertos, montado e bosques
- Migrador, visita-nos na primavera/verão

Picanço-real

Lanius meridionalis

- "Mini-rapina" conhecida por empalar as suas presas, para as consumir mais tarde
- Todo o país, mas menos comum no litoral norte e centro
- Habitats agroflorestais abertos e montados pouco densos
- Visível todo o ano

Autores | Mónica Costa e Rui Machado
SPEA

Picanço-de-dorso-ruivo

© Juan Varela



Picanço-barreteiro

© Juan Varela



Picanço-real

© Juan Varela